




Сибирская кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых. Сибирская кабарга классифицируется международным союзом охраны природы (МСОП) как уязвимый вид. Занесена в Красную книгу России, а также в Красную Книгу Кемеровской области. Обитает на крутых склонах гор, поросших хвойным лесом. Питаются лишайниками хвоей пихты и кедра, листьями черники и папоротником .



Сибирский северный олень - обитает в Кемеровской области (Кузбассе), в основном на территории государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Вид занесён в Красную книгу РФ и Красную книгу Кемеровской области. Летом олени обитают в горной тундре со снежниками, а зимой часть оленей спускается в таёжную зону под прикрытие леса. Питаются лишайниками, грибами и кустарниками.



Снежный барс (ирбис) считается исчезающим видом в Кемеровской области, поэтому занесен в красную книгу. Можно встретить на Поднебесных Зубьях со стороны Кузбасса. Ирбис хищное млекопитающее животное семейства кошачьих. Каждый барс охраняет свою территорию и избегает контактов с другими особями.



Аист черный- длина тела 90–100 см, размах крыльев 185–205 см, вес до 3 кг. Большая часть оперения черная с фиолетовым и зеленым отливом. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги малиново-красные. Питается в основном рыбой



Сокол - сапсан – длина тела 36–51 см, размах крыльев – 85–113 см. Вес самцов до 800, самок до 1300 г. Сверху однотонно-свинцово-серого цвета, голова почти черная. Снизу светло-серый, почти белый, с многочисленными поперечными темными пестринами. На щеках широкие черные «усы».



Журавль белый – длина тела — 140 см; размах крыльев — 2–2,3 м; вес — 5–8,6 кг. Перья в передней части головы вокруг глаз и клюва отсутствуют, кожа в этом месте у взрослых птиц окрашена в ярко-красный цвет, ноги длинные, красноватозеленые. Образ жизни связан с водным образом жизни, о чём говорит длинный клюв и строение ног, позволяющее передвигаться по вязкой почве.



Купальница — род многолетних травянистых растений из семейства Лютиковые. Высота — от 30 до 80 см, в зависимости от вида и условий произрастания. Цветы крупные, до 5–8 см в диаметре, одиночные или собраны в соцветия. Цветовая гамма варьируется от ярко-жёлтого и оранжевого до белого и кремового. Можно встретить от лесостепи до высокогорий Кузнецкого Алатау и Горной Шории.



Кандык сибирский — одно из наиболее ярких первоцветов — растений, цветущих ранней весной, когда только-только сошел снег. Можно наблюдать, как побег кандыка прорастает через еще не стаявший снег. Цветки могут распуститься, когда температура ниже нуля градусов. Луковицы кандыка содержат крахмал, глюкозу и белок.



Венерин башмачок - растет в светлых лесах на территории Кузнецкого Алатау. Венерин башмачок крупноцветковый расцветает только на 10-15 год жизни. Такое оригинальное название цветок получил благодаря форме бутона, у которого один из лепестков напоминает крохотную туфельку, а остальные окружают его словно праздничные шелковые ленты. Расцветает в июне.